

Preparación para la Colectomía



Preparación Miralax

- Tome esta preparación según las indicaciones.
- Recuerde beber abundante líquido.
- Lea y siga todas las instrucciones.

PREPARACIÓN

*Si está tomando **anticoagulantes**, comuníquese con el médico que le recetó el medicamento para obtener instrucciones.

.....

Compra en farmacia/supermercado:

(Todo disponible sin receta)

- Una (1) caja de tabletas de Dulcolax (bisacodilo) (caja de 4 tabletas)
- Miralax 8.3 oz (238 g)
- Una (1) botella de 64 oz y una (sin colorantes rojos). Si no le gusta el Gatorade, puede usar agua, Crystal Lite, etc.
- Recoja los antibióticos preoperatorios recetados en la farmacia.

Preparación:

Asegúrese de tomar los **antibióticos preoperatorios** según las instrucciones del frasco el día anterior a su procedimiento programado.

Recuerde beber líquidos claros a partir de las 5:00 p. m. del día anterior al procedimiento.

- Esta preparación suele surtir efecto en 30 minutos, pero puede tardar hasta 3 horas. Le recomendamos permanecer cerca de un baño, ya que podría tener múltiples evacuaciones intestinales.

Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, llame a nuestra oficina al [302-892-9900](tel:302-892-9900).

Preparación para la Colectomía



El día anterior a su procedimiento:

1:00 p. m. - Mezcle 8.3 oz de Miralax con una botella de 64 oz de Gatorade y enfrí bióticos (2 tabletas de Flagyl y 2 tabletas de neomicina).

2:00 pm- Tome la segunda dosis de antibióticos (2 tabletas de Flagyl y 2 tabletas de neomicina).

3:00 pm- Tome 2 ctabletas de Dulcolax seguidos de 3-4 vasos de líquido claro. e la mezcla. Tome la primera dosis de anti

5:00 pm - Beba lentamente la mezcla fría de Gatorade y Miralax. Beba 1 vaso cada 15 minutos hasta terminarla. **Comience su dieta de líquidos claros. No ingiera sólidos.**

8:00 pm - Tome la tercera dosis de antibióticos (2 tabletas de Flagyl y 2 tabletas de neomicina). Tome los otros 2 tabletas de Dulcolax seguidos de 3-4 vasos de líquido claro antes de la medianoche.

La dieta de líquidos claros:

- **¡Comience la dieta de líquidos claros a las 5:00 pm del día anterior a su procedimiento!**
- Los **líquidos claros** son cualquier alimento o bebida líquida transparente. *Esto incluye jugos de frutas (manzana, uva blanca, arándano blanco, etc.), Sprite, 7-Up, Ginger Ale, Jell-O, caldo claro, té, café negro, paletas heladas y diversas bebidas deportivas.
- **No** consuma productos lácteos. Esto incluye cremas y quesos.
- **No** consuma ningún producto con **colorante rojo** (Jell-O rojo, ponche de frutas, jugo de arándano, etc.).

RECORDATORIO: NO COMA NI BEBA NADA DESPUÉS DE LA MEDIANOCH

****El centro le informará la hora de su cita un día antes del procedimiento****

***Recuerde: Puede presentar distensión abdominal y cólicos, así como náuseas y vómitos. Esto suele ser temporal y los síntomas deberían desaparecer a medida que comience a evacuar.**

Si tiene alguna pregunta sobre estas instrucciones, llame a nuestra oficina al **302-892-9900**.